FIELD

il futuro in campo

CRISTINA MACCI

CRISTINA.MACCI@CNR.IT

27-28 Aprile 2021

FIELD

il futuro in campo

Riciclo dei sedimenti nei progetti LIFE

Cristina Macci: cristina.macci@cnr.it

CleAnsed: LIFE12 ENV/IT/000652

Data di inizio progetto: 1 ottobre 2013

Data di fine progetto: 31 marzo 2016

OBIETTIVI

1. Dimostrazione del riciclo dei sedimenti decontaminati mediante tecnologia AGRIPORT nel settore vivaistico
2. Dimostrazione dell'uso dei sedimenti freschi nella costruzione di strade

Coordinatore:

CNR-ISE Istituto per
lo Studio degli
Ecosistemi

Beneficiari:

DICI Dipartimento di
Ingegneria Civile e
Industriale

Navicelli S.p.a.

CSIC-CEBAS Centro de Edafologia y
Biologia Aplicada del Segura

CNR-IBIMET Istituto
di biometeorologia

Dipartimento di Scienze delle
Produzioni Agroalimentari e
dell'Ambiente

La Strategia

gli interventi di processo sono ridotti al minimo per ridurre i costi e l'uso di energia

1. Dimostrazione dell'uso dei sedimenti decontaminati nel settore vivaistico

Sedimenti trattati con tecnologia AGRIPORT

- Omogeneizzare il substrato
- Aumentare l'attività microbica
- Ridurre la contaminazione organica

Post-Trattamento Landfarming

Vivaistica

Landfarming

Rimozione delle piante
Periodico rivoltamento dei sedimenti
Tempi: 3 mesi
Monitoraggio: 1.5 mesi (T1) e 3 mesi (T2)

- Rimozione delle piante
- Periodico rivoltamento dei sedimenti all'interno di ogni contenitore (12)

- 3 mesi di landfarming
- Prelievo dei sedimenti: 1.5 mesi (T1) e 3 mesi (T2)

Caratteristiche fisiche e chimiche paragonabili a quelle di un substrato agronomico (D.lgs 75/2010)

Parametri	Sedimenti alla fine del landfarming	DM 161/2012 D lgs 152/2006		D. lgs. 75/2010 Substrato di coltivazione misto	Suolo agronomico
		Tab A Uso urbano	Tab B. Uso industriale		
Densità apparente(g/cm ³)	1,05			0,95	1-2
pH	8,45			4,5-8,5	7,3-8,2
Conducibilità elettrica(dS/m)	0,20			<1	2
TOC %	3,12			>4	0,7-12
TN %	0,20			<2,5	0,15-0,4
TP (g/Kg)	0,80				0,2-5
P ₂ O ₅ %	0,10			<1,5	
Cd (mg/kg)	10,2	2	15	1,5	
Cu (mg/kg)	83,8	120	600	230	
Hg (mg/kg)	-	1	5	1,5	
Ni(mg/kg)	52,4	120	500	100	
Pb(mg/kg)	68,7	100	1000	140	
Zn (mg/kg)	140	150	1500	500	
Cr (mg/kg)	20,1	150	800	-	

1° caso: Conclusioni Landfarming

Landfarming per:

- Omogeneizzare il substrato
- Aumentare l'attività biologica (30%)
- Ulteriore riduzione della contaminazione organica (20%)

Matrice idonea per il riutilizzo in vivaistica,
conforme alla normativa per substrati
agronomici 75/2010, eccetto x il TOC: 3%
invece di 4%

Trattamenti:

Dovuto al basso contenuto in nutrienti e alla bassa capacità di ritenzione idrica: miscelazione con un suolo agronomico 50:50 – 33:66 – 0:100

Piante:

3 specie ornamentali:

Viburnum tinus L. (1)

Eleagnus macrophylla L. (2),

Photinia x fraseri var. Red Robin (3)

1

2

3

Preparazione delle miscele Aprile 2014

Controllo

T33

T50

	CTL	T33	T50
% Sedimento fitorimediato	0%	33%	50%

Crescita delle piante

Novembre
2015

Controllo: 100% suolo

T33: 33% sedimento Cleansed + suolo

Le piante hanno dimostrato un buon adattamento ai substrati producendo un denso fogliame, crescendo in altezza e nel diametro del fusto

La crescita nei substrati T33 and T50 è simile o maggiore (Viburno) del CTL

T50: 50% sedimento Cleansed + suolo

Parametri finali di biomassa (campionamento distruttivo Novembre 2015)

Viburnum tinus L.

Nessuna differenza tra i substrati per Photinia e Eleagnus

	H Fin (cm)	ΔH (cm)	$\varnothing$ fin (mm)	$\Delta\varnothing$ (mm)	Leaf area (m ²)	DW Leaf (g)	DW wood (g)
CTL	64±14	39±15	23±5	11±5	1.24±0.6	152±65	152±78
T33	79±5	50±7	25±5	11±4	2.44±0.4	247±45	259±76
T50	89±5	62±5	28±6	16±8	2.2±0.5	237±51	269±67

T33 e T50 hanno una maggiore biomassa

Valutazione delle zolle

Photinia x fraseri

In T33 e T50 la zolla si sfalda
Nel Controllo la zolla rimane
compatta > argilla

Viburnum tinus

La zolla rimane compatta per
tutte le radici
Apparato radicale ben
sviluppato e ramificato

Eleagnus macrophylla

Le zolle tendono a rompersi
in grandi blocchi per tutte le
matrici

2. Dimostrazione dell'uso dei sedimenti decontaminati per la costruzione di strade

Riduzione di:

- H₂O
- Sostanza organica
- Contaminanti organici

La sostanza organica e i contaminanti organici sono degradati dai microrganismi e usati come fonte di carbonio per la crescita e per l'energia

**Dragaggio di circa 800 m³
sedimenti freschi e stoccaggio
in vasca**

**Landfarming per circa 5 mesi,
monitoraggio 2.5 mesi and 5 mesi**

**Il trattamento di landfarming è consistito
nella periodica areazione del sedimento (1-2
volte/settimana) mediante rivoltamento
meccanico**

2° caso: Conclusioni Landfarming

Landfarming per:

- Riduzione di acqua
- Riduzione della sostanza organica
- Riduzione dei contaminanti organici

Non abbastanza

Strada di 100m

Con lo scopo di ridurre il contenuto di acqua fino a valori ottimali (19%), la percentuale di calce da aggiungere è passata dal 5%, necessaria alla stabilizzazione, al 15%

Doppio effetto: stabilizzazione dei sedimenti e disidratazione

Sedimenti di dragaggio disidratati e stabilizzati con calce

Disegno esecutivo della strada vista dall'alto

Costruzione 100 m di strada

➤ Inaugurazione
16 Marzo 2015

Demonstration of the suitability of dredged remediated sediments for safe and sustainable horticulture production

HORTISED

LIFE14 ENV/IT/000113

Coordinatore:

DISPAA
Department of Agri-Food and of
Environmental Science
University of Florence

Partnership

Data di inizio progetto: 1 Ottobre 2015

Data di fine progetto: 31 marzo 2018

Beneficiari:

CNR
Consiglio Nazionale
delle Ricerche

ISE-CNR
Institute for Ecosystem
Studies of the National
Research Council, Pisa

ISE
Istituto per lo Studio
degli Ecosistemi

UMH
Miguel Hernandez University of
Elche, Alicante

ZELARI
AZ. AGRICOLA ZELARI COMPANY
S.S. - Pieve a Nievole, Pistoia

ZELARI COMPANY

CALIPLANT
VIVEROS CALIPLANT, S.L.
San Javier, Murcia

OBIETTIVI

- Dimostrare l'idoneità dei sedimenti dragati bonificati come alternativa per la preparazione dei substrati di coltivazione in orticoltura
- Dimostrare le potenzialità dei substrati di coltivazione a base di sedimento per la crescita di melograno e fragola come piante modello su scala agricola in Italia e Spagna
- Implementare le norme legislative per l'uso di substrati innovativi in orticoltura
- Dare un rilevante contributo alla gestione sostenibile dei sedimenti.

PROGETTO AGRIPORT

PROGETTO HORTISED

Dragaggio	Fitorimediazione	Landfarming	Sedimenti decontaminati

Caratterizzazione fisica, chimica, biochimica e tossicologica dei sedimenti decontaminati

Substrati colturali per specie "food"

<p>TS0 100% tradizionale (torba+pomice)</p>	<p>TS50 50% tradizionale 50% sedimento decontaminato</p>	<p>TS100 100% sedimento decontaminato</p>
---	--	---

Rimozione delle piante

tecnologia di biorisanamento in cui i sedimenti contaminati vengono distesi e mescolati con sostanze nutritive, periodicamente irrigati e aerati. I contaminanti organici sono degradati dai microrganismi e utilizzati come fonte di carbonio per la crescita e l'energia.

- ✓ omogenizzare il substrato
- ✓ stimolare le attività biologiche
- ✓ ridurre ulteriormente la contaminazione organica

Periodica aerazione (una volta alla settimana) mediante rivoltamento meccanico dei sedimenti per un periodo di tre mesi

Copertura dei sedimenti nei giorni di pioggia

- 3 punti di campionamento in 40m²: A, B, C in 1 m² ciascuno
- 10 sotto-campioni per ogni punto di campionamento
- Campagna di campionamento:
 - T0, caratterizzazione iniziale
 - T1, dopo un mese, T2, dopo due mesi, T3, dopo tre mesi

Landfarming

- Aumento dell'attività microbica (aumento delle attività enzimatiche)
- Mineralizzazione della sostanza organica (diminuzione di C, N, P nelle forme totali, aumento delle forme solubili)
- Diminuzione della contaminazione organica(15/20%)
- Contaminazione inferiore ai limiti di legge (Dlgs 152/2006 tab A.) con l'eccezione di Zn, C>12 e IPA
- Nonostante la contaminazione residua, Indice di germinazione (circa 150%) indica assenza di tossicità per le piante

Caratteristiche fisiche e chimiche paragonabili a quelle di un substrato agronomico (D.lgs 75/2010)

Parametri	Sedimenti alla fine del landfarming	DM 161/2012 D lgs 152/2006		D. lgs. 75/2010 Substrato di coltivazione misto	Suolo agronomico
		Tab A Uso urbano	Tab B. Uso industriale		
Densità apparente(g/cm ³)	1,08 ±0,07			0,95	1-2
pH	8,10 ±0,01			4,5-8,5	7,3-8,2
Conducibilità elettrica(dS/m)	0,33 ±0,04			<1	2
TOC %	1,57 ±0,02			>4	0,7-12
TN %	0,13±0,01			<2,5	0,15-0,4
TP (g/Kg)	0,58±0,03				0,2-5
P ₂ O ₅ %	0,11±0,02			<1,5	
Cd (mg/kg)	0.96 ±0,06	2	15	1,5	
Cu (mg/kg)	34,3 ± 4,3	120	600	230	
Hg (mg/kg)	0,075± 0,001	1	5	1,5	
Ni(mg/kg)	34,6 ± 5,33	120	500	100	
Pb(mg/kg)	35,2 ± 3,7	100	1000	140	
Zn (mg/kg)	248 ± 11	150	1500	500	
Cr (mg/kg)	49.1± 9	150	800	-	
C>12 (mg/kg)	86 ,5	50	750	-	
IPA (mg/kg)	47,7	10	100	-	

Prove in orticoltura

Landfarming

Sedimenti decontaminati

Substrati culturali

- TS0**
100% substrato tradizionale
- TS50**
50% substrato tradizionale
50% sedimento decontaminato
- TS100**
100% sedimento decontaminato

Camarosa, Monterey

Camarosa, Monterey,
Sant'Andrea

Purple Queen, Mollar

Purple Queen, Mollar

Ballerina

ZELARI

AZ. AGRICOLA ZELARI
COMPANY S.S. - Pieve a
Nievole, Pistoia

Fragola

Substrati

TS100 = 100% sedimento decontaminato

TS50 = 50% substrato tradizionale + 50% sedimento decontaminato

TS0 = 100% substrato tradizionale (torba+pomice)

Blocchi (B): in triplicato con 30 litri di substrato di crescita e 10 piante ciascuno

Analisi pianta

- **Biomassa Pianta**
- **Produzione Pianta**
- **Qualità nutraceutiche**
- **Sicurezza alimentare: Contaminati Organici e inorganici**

le proprietà agronomiche e funzionali di tutti i substrati sono risultate idonee alla crescita e lo sviluppo delle piante anche nel substrato preparato solo con sedimenti, come osservato dai dati sulle piante

Resa, numero di frutti e peso medio dei frutti in TS50 e TS0 simili, mentre la peggiore produzione in TS100

Trattamento	Cu (mg kg ⁻¹ d.w)	Zn (mg kg ⁻¹ d.w)	Pb (mg kg ⁻¹ d.w)	Ni (mg kg ⁻¹ d.w)	Cd (mg kg ⁻¹ d.w)
TS0	3.8 a	15 a	<LOD	0.37 a	<LOD
TS50	3.2 a	11 a	<LOD	0.38 a	<LOD
TS100	2.3 b	13 a	<LOD	0.35 a	<LOD

Non si è riscontrata contaminazione nella pianta (radici, fusto, foglie) e nel frutto

CODEX ALIMENTARIUS

CONTAMINANTE	ALIMENTO	mg/kg peso fresco Limiti massimi
Micotossine	No frutta/verdura	5
Arsenico	Acqua minerale	0.01
Cadmio	Frutta e Ortaggi a foglia	0.05
Piombo	Frutti, piccoli frutti, ortaggi a foglia	0.1
Mercurio	Acqua, pesce (metilmercurio)	0.001 0.5
Acilonitrile	Tutti	0.02
Cloropropanoli	Proteina vegetale idrolizzata	0.4
Cloruro di vinile	Tutti	0.01

Analisi contaminanti organici_FRAGOLA

Congeners	C-TS0	C-TS50	C-TS100	M-TS0	M-TS50	M-TS100
PCB-77	0.23 (0.02) a	0.84 (0.07) bc	2.3 (0.9) b	0.4 (0.1) c	0.61 (0.07) bc	1.4 (0.6) bc
PCB-81	0.21 (0.02) a	0.20 (0.01) a	0.20 (0.01) a	0.20 (0.01) a	0.19 (0.01) a	0.20 (0.01) a
PCB-105	0.61 (0.06) a	2.9 (0.8) b	5.2 (0.8) c	0.7 (0.1) a	1.8 (0.6) b	10 (1) d
PCB-114	0.20 (0.01) a	0.30 (0.07) a	0.90 (0.07) b	0.20 (0.01) a	0.20 (0.01) a	1.3 (0.5) b
PCB-118	1.6 (0.5) a	6.1 (0.9) b	15.7 (0.9) c	2.0 (0.5) a	4.9 (0.8) b	27 (4) d
PCB-123	0.20 (0.02) a	0.30 (0.03) b	0.40 (0.07) bc	0.20 (0.01) a	0.20 (0.01) a	0.5 (0.1) c
PCB-126	0.21 (0.01) a	0.21 (0.01) a	0.21 (0.01) a	0.20 (0.01) a	0.21 (0.01) a	0.22 (0.01) a
PCB-156	0.21 (0.01) a	0.70 (0.06) b	0.99 (0.07) c	0.20 (0.01) a	0.43 (0.09) d	1.4 (0.8) abcd
PCB-157	0.20 (0.02) a	0.30 (0.05) b	0.20 (0.02) a	0.20 (0.01) a	0.21 (0.02) a	0.20 (0.01) a
PCB-167	0.24 (0.04) ac	0.30 (0.01) a	0.60 (0.11) b	0.20 (0.01) c	0.28 (0.04) a	0.61 (0.08) b
PCB-169	0.21 (0.01) a	0.20 (0.02) a	0.19 (0.01) a	0.22 (0.01) a	0.20 (0.01) a	0.20 (0.01) a
PCB-189	0.21 (0.01) a	0.21 (0.01) a	0.30 (0.05) b	0.20 (0.01) a	0.18 (0.01) a	0.21 (0.01) a
Σ DL-PCBs	4.3 (0.5) a	13 (2) b	27 (2) c	4.9 (0.5) a	9 (1) d	44 (4) e
Σ DL-PCBs (as TEQ)	0.028 (0.001) a	0.0270 (0.0007) a	0.0274 (0.0009) a	0.0266 (0.0007) a	0.0267 (0.0007) a	0.0275 (0.0004) a

Solo le diossine sono state rilevate nei frutti. Considerando la concentrazione tossica equivalente, tutti i trattamenti mostrano concentrazioni simili e circa quattro volte inferiori ai limiti massimi stabiliti dalla normativa UE

- Codice Alimentare (EC, No 663/2014): massima concentrazione di PCB negli alimenti= 0.1 pg TEQ/g peso fresco

Polifenoli totali

Antociani totali

Capacità antiossidante_Camarosa

Capacità antiossidante_Monterey

Le fragole hanno proprietà nutraceutiche equiparabili (in alcuni casi maggiore) alla frutta coltivata sul controllo

Obiettivo: dimostrare (confermare) che è possibile convertire un rifiuto (il sedimento marino dragato) in una risorsa (un substrato commerciale) capace di sostituire substrati tradizionali come torba e fibra di cocco

Sedimenti rimediati per la produzione di:

- alberi da frutto (olivo e agrumi)
- piante ornamentali (protea, calla, lauro)
- piante alimentari (basilico, mirtillo, fragoline di bosco)

Risultati attesi:

- valutazione dell'idoneità dei sedimenti per la produzione vivaistica di specie alimentari e non
- la valutazione della crescita e della qualità commerciale delle colture
- definizione di protocolli per l'utilizzo del nuovo substrato

**Landfarming 3 mesi:
Periodica aerazione (una volta alla settimana) mediante
rivoltamento meccanico dei
sedimenti per
un periodo di tre mesi**

- 3 punti di campionamento in circa 40m²:
- 10 sub-campioni per ogni punto di campionamento

- Simili risultati progetto Hortised
- Aumento dell'attività microbica (aumento delle attività enzimatiche)
- Mineralizzazione della sostanza organica
- Diminuzione della contaminazione organica (15/20%)
- Contaminazione inferiore ai limiti di legge (Dlgs 152/2006 tab A.) con l'eccezione di IPA
- Nonostante la contaminazione residua, Indice di germinazione (circa 140%) indica assenza di tossicità per le piante

Caratteristiche fisiche e chimiche paragonabili a quelle di un substrato agronomico (D.lgs 75/2010)

Parametri	Sedimenti alla fine del landfarming	DM 161/2012 D lgs 152/2006		D. lgs. 75/2010 Substrato di coltivazione misto	Suolo agronomico
		Tab A Uso urbano	Tab B. Uso industriale		
Densità apparente(g/cm ³)	1,18 ±0,05			0,95	1-2
pH	7,40 ±0,2			4,5-8,5	7,3-8,2
Conducibilità elettrica(dS/m)	0,13 ±0,01			<1	2
TOC %	1,38 ±0,08			>4	0,7-12
TN %	0,11±0,01			<2,5	0,15-0,4
P ₂ O ₅ %	0,17±0,01			<1,5	
Cd (mg/kg)	<LOD	2	15	1,5	
Cu (mg/kg)	48,6 ± 1,7	120	600	230	
Hg (mg/kg)	0,070± 0,001	1	5	1,5	
Ni(mg/kg)	37,7 ± 0,7	120	500	100	
Pb(mg/kg)	37,2 ± 6,4	100	1000	140	
Zn (mg/kg)	145 ± 4	150	1500	500	
Cr (mg/kg)	46.2± 3	150	800	-	
C>12 (mg/kg)	38,0 ± 6	50	750	-	
IPA (mg/kg)	43,0 ± 12	10	100	-	

Piante ornamentali: *Prunus laurocerasus* (rooted cuttings)= Lauro

Substrati:

LMix 1: 100% PBS (controllo)

LMix 3: 50% PBS, 50% TS (v/v)

LMix 5: 50% CFBS, 50% TS (v/v)

LMix 7: 50% WFBS, 50% TS (v/v)

LMix 2: 75% PBS, 25% TS (v/v)

LMix 4: 75% CFBS, 25% TS (v/v)

LMix 6: 75% WFBS, 25% TS (v/v)

Legenda:

PBS = Substrato a base di torba: 60% torba, 40% pomice v/v

TS = sedimenti trattati

CFBS = substrato a base di fibra di cocco: 60% fibra di cocco, 40% pomice v/v

WFBS = Substrato a base di fibra di legno: 60% fibra di legno, 40% pomice v/v

Regimi idrici:

WR1: normale

WR2: basso (ridotto del 30%)

Rep 1	WR1	LMix 7	LMix 4	LMix 5	LMix 2	LMix 1	LMix 6	LMix 3
	WR2	LMix 7	LMix 4	LMix 5	LMix 2	LMix 1	LMix 6	LMix 3
Rep 2	WR1	LMix 6	LMix 1	LMix 3	LMix 7	LMix 5	LMix 4	LMix 2
	WR2	LMix 6	LMix 1	LMix 3	LMix 7	LMix 5	LMix 4	LMix 2
Rep 3	WR1	LMix 5	LMix 3	LMix 2	LMix 6	LMix 4	LMix 7	LMix 1
	WR2	LMix 5	LMix 3	LMix 2	LMix 6	LMix 4	LMix 7	LMix 1

Disegno sperimentale

Totale 336 talee di alloro in vasi da 8,5 L: 4 vasi per ogni combinazione di "substrato x regime idrico" (ciascuno costituito da 2 talee), replicate 3 volte.

LAUREL/OLIVE/STRAWBERRY/BLUEBERRY

L1		60% peat	40% pumice
L2	25%sediment	45% peat	30% pumice
L3	50%sediment	30% peat	20% pumice
L4	25%sediment	45% coconut	30% pumice
L5	50%sediment	30% coconut	20% pumice
L6	25%sediment	45% fibril	30% pumice
L7	50%sediment	30%fibril	20% pumice

La miscelazione con torba, fibra di cocco e fibra di legno aumenta il contenuto di carbonio, raggiungendo il valore del 4% come richiesto dalla normative Italiana sui substrati agronomici (D.Lgs 75/2010), in tutte le miscele

LAUREL/OLIVE/STRAWBERRY/BLUEBERRY

L1		60% peat	40% pumice
L2	25%sediment	45% peat	30% pumice
L3	50%sediment	30% peat	20% pumice
L4	25%sediment	45% coconut fiber	30% pumice
L5	50%sediment	30% coconut fiber	20% pumice
L6	25%sediment	45% wood fiber	30% pumice
L7	50%sediment	30% wood fiber	20% pumice

La miscelazione consente la diminuzione della densità apparente fino al valore di <0,95 (D.Lgs 75/2010)

Le attività enzimatiche sono correlate al carbonio organico

Raccolta dati

Analisi non distruttive:

- Mortalità delle piante (numero; percentuale)
- Diametro stelo base
- Altezza massima della pianta
- Numero di germogli vegetativi
- Lunghezza del germoglio vegetativo primario
- Numero di foglie completamente espanso sul germoglio vegetativo primario
- Colore lama fogliare
- Attività fotosintetica del CIRAS-2

Analisi distruttive

- Area fogliare
- Contenuto di clorofilla
- Peso fresco e secco dell'intera pianta
- Peso fresco e secco del fusto (parte aerea)
- Peso fresco e asciutto dell'apparato radicale
- Analisi della malondialdeide (MDA) per lo stress ossidativo
- Analisi dei metalli pesanti (in corso)

Fattore	BSD	MPH	NVS	LVS	NEL
Substrato	ns	**	**	**	**
Regime idrico	ns	ns	ns	ns	ns

ns = non significativo
 * significativo per $p < 0.05$
 ** significativo per $p < 0.01$

Legenda: BSD=Diametro base stelo; MPH=Altezza massima della pianta; NVS=Numero di germogli vegetativi; LVS=Lunghezza dei germogli vegetativi; NEL=Numero di foglie completamente espanso sui germogli vegetativi

Dati di crescita significativamente differenti in base al substrato ma non differenti per regime idrico

Substrate	MPH	NVS	LVS	NEL
LMix 1	38.5 a	6.2 a	20.8 a	14.2 a
LMix 2	36.1 ab	5.3 b	17.2 b	13.7 ab
LMix 3	33.5 b	4.6 c	15.7 bc	12.7 ab
LMix 4	36.3 ab	4.7 bc	16.9 b	13.4 ab
LMix 5	31.1 c	4.3 c	14.4 c	12.0 bc
LMix 6	26.8 d	4.6 c	11.5 d	10.8 c
LMix 7	25,6 d	3.6 d	10.9 d	10.4 c

No differenza significativa tra 25% e 50% sedimento

←

Torba

←

Fibra cocco

←

Fibra legno

Minore sviluppo

←

Peso secco della pianta (DW) e superficie fogliare totale (aprile 2021)

	Stelo DW (g)	Foglie DW (g)	Radici DW (g)	Totale DW (g)	superficie foglia totale (cm ²)
Substrati					
LMix 1	42.6 a	116.7 ab	134.8 bc	294.1 bc	9.764.2 a
LMix 2	42.8 a	126.0 a	197.7 a	366.4 a	8.632.6 ab
LMix 3	31.6 b	89.3 c	126.7 bcd	247.6 cd	7.282.6 bc
LMix 4	42.3 a	119.4 a	155.5 ab	317.2 ab	8.442.8 ab
LMix 5	31.6 b	93.0 bc	93.3 cd	218.0 de	6.621.3 c
LMix 6	18.4 c	55.4 d	91.7 cd	165.5 e	4.885.4 d
LMix 7	18.2 c	56.6 d	82.5 d	157.3 e	4.357.3 d
Regime idrico					
WR1	29.6 b	ns	ns	ns	6.677.6 b
WR2	35.3 a	ns	ns	ns	7.604.2 c

DW: sostanza secca

- Trattamento con torba e 25% sedimento (MIX 2), migliore della sola torba (MIX 1)
- Peggior sviluppo in presenza di fibra di legno (MIX 6 e 7)

Colore della lama fogliare e indice di cromaticità (agosto 2020)

Agosto 2020

Substrate	L brightness	a redness	b yellowness	Chroma index
LMix 1	34.1 a	-6.6 e	11.8 a	13.6 a
LMix 2	34.9 a	-7.1 d	13.1 a	14.8 a
LMix 3	36.1 b	-7.6 c	15.0 b	16.8 b
LMix 4	35.9 b	-7.9 b	15.2 b	17.1 b
LMix 5	36.6 b	-8.0 b	16.2 b	18.1 b
LMix 6	45.3 d	-10.1 a	30.1 d	31.7 d
LMix 7	45.4 c	-9.9 a	27.0 c	28.8 c

Ottobre 2020

Substrate	Chroma index
LMix 1	14.1 ab
LMix 2	13.4 a
LMix 3	14.1 ab
LMix 4	14.7 bc
LMix 5	14.3 bc
LMix 6	16.5 d
LMix 7	14.9 c

Ottobre 2018-Marzo 2022

Obiettivo: Recuperare i sedimenti dragati attraverso un processo di co-compostaggio con rifiuti verdi per produrre un tecno-suolo innovativo per il recupero di terreni degradati e per la coltivazione di piante ornamentali in Italia e Repubblica Ceca

Risultati attesi:

- Definizione dei protocolli di compostaggio per la preparazione di substrati di crescita basati su sedimenti
- Coltivazione di piante ornamentali (*Viburnum tinus* e *Photinia x fraserii*) in substrati innovativi
- Recupero di terreni degradati mediante l'applicazione di tecno-suolo

La Strategia Agrised

- Processo aerobico di decomposizione biologica della sostanza organica (anche contaminanti organici) in condizioni controllate
- Prodotto biologicamente stabile con elevato grado di evoluzione della sostanza organica e ricco di microrganismi non patogeni

1. Fase mesofila (25-45°C)

2. Fase termofila (>55°C)

3. Fase di raffreddamento

4. Fase di maturazione

Degradazione biochimica di materia organica fresca (mineralizzazione)

Sintesi di sostanze umiche (umificazione)

Compost: materiale umificato che risulta da processi di compostaggio, con **proprietà di ammendante e fertilizzante**

Fattori di Controllo

La vitalità dei microrganismi decompositori è fondamentale per una buona riuscita del compostaggio per questo motivo, durante lo svolgimento del processo, vengono eseguiti accorgimenti volti a favorire il loro sviluppo e a conservare un ambiente che soddisfi le loro esigenze metaboliche

Umidità		Aerazione		Temperatura
50C° Max Efficienza microrganismi decompositori
Umidità	Microrganismi Decompositori			
20%	Assenti	Degradazioni aerobiche $\text{CO}_2 \leftarrow \text{C} \rightarrow \text{CH}_4$ $\text{PO}_4^{3-} \leftarrow \text{P} \rightarrow \text{PH}_3$ $\text{SO}_4^{2-} \leftarrow \text{S} \rightarrow \text{H}_2\text{S}$ $\text{NO}^3 \leftarrow \text{N} \rightarrow \text{NH}_3$	Degradazioni anaerobiche	T° >55°C = Sterilizzazione D. lgs. 75/2010 >55°C per 14 giorni >60°C per 7 giorni >65°C per 5 giorni >70°C per 3 giorni
30%	Metabolismo rallentato			
45%	Attivi			
50%-55%	<i>Range ottimale</i>			
60%	Attivi			
70%	Assenti			

2 siti sperimentali

Canale dei Navicelli (Lunghezza: 17 km, larghezza: 30 m, profondità: 3 m), un canale navigabile che connette Pisa a Livorno (Italia) e sfocia nel Mare)

Piccolo canale situato nell'area agricola a Kunice, Repubblica Ceca

CO-Composting
Sedimenti e rifiuti verdi (ottenuti dal mantenimento di aree verdi pubbliche e private) miscelati in tre rapporti (p:p) 1: 1; 3: 1; 1: 3.

6-8 mesi per la piena maturazione e stabilizzazione dei materiali compostati. Conformità alle normativa della Repubblica Ceca (Act No. 156/1998, Col) e Italiana (D.lgs 75/2010) per i substrati agronomici

Monitoraggio: ogni settimana nel primo mese e ogni mese::

- temperatura,
- umidità,
- densità apparente
- sostanze umiche
- contenuto di sostanze inquinanti
- Comunità microbiche
- Attività enzimatiche

Presso l'impianto di compostaggio EPS a
Nový Dvůr, Repubblica Ceca

Inizio compost in Italia: 29 ottobre 2020

Pistoia, Italia

	Agrised Compost/substrate Czech Republic			Agrised Compost/substrate Italy			Italian legislation on fertilizers D. <u>Las. 75/2010</u>		Czech Republic legislation on fertilizer Decree No: 474/2000		on Sediment reuse in agriculture Decree No: 257/2009	European Legislation on fertilizers
	A	B	C	A	B	C	Green Compost	Mixed substrate	Substrate with high presence of mineral component			Growth substrate
	Bulk density(g/cm ³)	1,00	0,81	0,75	0,88	0,69	0,58		<0,95			
pH	8,12	8,12	8,18	7,4	7,5	7,3	6-8,5	4,5-8,5	5-7,5			
E.C.(dS/m)	0,86	0,78	0,75	2,7	2,4	1,2		<1	<0,6			
TOC %	3,02	3,04	5,04	1,66	3,54	9,39	>20	>4	10-50%			
Volatile solids(%)	6,5	7,8	13,3	4,1	8,2	18,4						
TN %	0,26	0,31	0,48	0,15	0,31	0,58		<2,5				
C/N	11,6	9,8	10,5	11,1	11,4	16,2	<50					
P ₂ O ₅ %	0,002	0,003	0,005	0,001	0,001	0,005		<1,5				
Humic substances	2,09	2,62	3,3	1,37	2,24	6,28	> 2,5					
Salmonella	no	no	no	To be determined			no	All metal limits are respected		no	no	
E.Coli (CFU/g)	<100	<100	<100	To be determined			<1000				<1000	
Germination Index(%)	124	117	108	85	86	80	>60			>30		
E.Coli (CFU/g)	<100	<100	<100	To be determined			<1000		More restrictive		<1000	
Cd (mg/kg)	0,2	0,02	0,2	0,38	0,30	0,23	<1,5	<1,5	<2	<1	<1,5	
Cu (mg/kg)	34	27	32	33	29	21	<230	<230	<100	<100	<200	
Hg (mg/kg)	<0,1	<0,1	<0,1	0,05	0,04	0,05	<1,5	<1,5	<1	<0,8	<1,5	
Ni (mg/kg)	16	12	13	32	30	28	<100	<100	<100	<80	<50	
Pb (mg/kg)	12	9,4	11	23	22	20	<140	<140	<140	<100	<120	
Zn (mg/kg)	70	60	60	96	105	99	<500	<500	<500	<300	<500	
Cr (mg/kg)	19	15	15	30	36	29		<100		<200		
As (mg/kg)	2,9	2,9	3,9							<30		
Be (mg/kg)	0,5	0,4	0,6							<5		
Co (mg/kg)	4,3	4,1	5,4							<30		
V (mg/kg)	20	19	24							<180		
IPA(mg/kg)	0,45	0,41	0,40							<6		
PCB (mg/kg)	<0,01	<0,01	<0,01							<0,2		
C10-C40 (mg/kg)	85,5	64,8	62,9							<300

Substrati	Composizione
1	50% torba, 50% pomice+ 4kg/m ³ Basacote
2	Compost 75% G.W., 25% S. + 4kg/m ³ Basacote
3	Compost 50% G.W., 50% S.+ 4kg/m ³ Basacote
4	Compost 25% G.W., 75% S. + 4kg/m ³ Basacote
5	40%Compost (75% G.W., 25%S.), 40% torba, 20% pomice + 4kg/m ³ Basacote
6	40%Compost (50% G.W., 50% S.), 40% torba, 20% pomice + 4kg/m ³ Basacote
7	40%Compost (25% G.W., 75% S.), 40% torba, 20% pomice + 4kg/m ³ Basacote

G.W. Scarto verde, S. Sedimento

Due piante ornamentali:
Fraser Photinia and
Laurustinus

N° piante: 560

vasi: Ø 24 cm

Rinvaso autunnale 1/10/21

Dati da raccogliere:

- Altezza piante (cm)
- Sostanza secca (g)
- Rapporto chioma/radice
- Superficie della pianta(cm²)

Photinia x fraseri

Viburnum tinus

Durante la fase di rinvaso iniziale (T0) e dopo 5 mesi (T0) sono state prelevate 5 piante/specie, lavate le radici e poi sono state effettuate misure di altezza e rilievi distruttivi per quantificare la biomassa secca

Dati da raccogliere:

- Misura periodica della crescita della pianta
- Attività fotosintetica
- Fluorescenza
- Valutazione di stress ossidativo

Altezza (cm), peso fresco e secco (g), rapporto chioma/ radici e peso secco / fresco nelle piante *Fraser Photinia* dopo 5 mesi di coltivazione

Substrate	H		FW	DW			S/R	DW/FW
	T0	T5		chioma	radici	Totale		
Control (50% torba/ 50% Pomice)	59	61	396	79.6	35.4	115.0	2.2	0.29
Sedimenti/Scarti verdi 1:3	57	57	280	63.8	26.8	90.6	2.4	0.32
Sedimenti/Scarti verdi 1:1	57	70	364	85.2	36.0	121.2	2.4	0.33
Sedimenti/Scarti verdi 3:1	58	62	381	83.5	47.7	131.2	1.8	0.34
40% S-GW 1:3 /40% torba /20% pomice	59	61	339	76.2	29.5	105.7	2.6	0.31
40% S-GW 1:1 /40% torba/20% pomice	60	60	318	74.4	26.4	100.8	2.8	0.32
40% S-GW 3:1 /40% torba /20% pomice	57	62	367	82.7	33.4	116.1	2.5	0.32

H: altezza; FW: peso fresco; DW: peso secco; S/R: chioma/radici

- Crescita limitata dovuta alla stagione invernale piuttosto rigida
- Tutti i parametri di crescita, non hanno mostrato differenze significative tra i differenti substrati
- Altezza, sostanza secca e partizione simili alle piante cresciute nel controllo a base di torba
- Anche i rapporti S/R e DW/FW hanno mostrato lo stesso andamento in tutti i trattamenti, confermando un equilibrio generale tra le piante testate

Altezza (cm), peso fresco e secco (g), rapporto chioma/radici e peso secco / fresco nelle piante *Viburnum tinus* dopo 5 mesi di coltivazione

Substrate	H		FW	DW			S/R	DW/FW
	T0	T5		chioma	radici	Totale		
Control (50% torba/ 50% Pomice)	68	73.5	610.3	130.1	40.2	170.3	3.2	0.28
Sedimenti/Scarti verdi 1:3	66	72.5	702.1	143.6	53.6	197.2	2.7	0.28
Sedimenti/Scarti verdi 1:1	64	67.0	434.3	108.2	32.1	140.3	3.4	0.32
Sedimenti/Scarti verdi 3:1	71	71.8	424.2	105.5	31.0	136.5	3.4	0.32
40% S-GW 1:3 /40% torba /20% pomice	66	62.5	565.5	131.5	41.0	172.5	3.2	0.31
40% S-GW 1:1 /40% torba/20% pomice	65	60.5	453.6	106.0	35.7	141.7	3.0	0.31
40% S-GW 3:1 /40% torba /20% pomice	63	63.8	445.3	107.3	32.7	140.0	3.3	0.31

H: altezza; FW: peso fresco; DW: peso secco; S/R: chioma/radici

- Crescita limitata dovuta alla stagione invernale piuttosto rigida
- Tutti i parametri di crescita, non hanno mostrato differenze significative tra i differenti substrati
- Altezza, sostanza secca e partizione simili alle piante cresciute nel controllo a base di torba
- Anche i rapporti S/R e DW/FW hanno mostrato lo stesso andamento in tutti i trattamenti, confermando un equilibrio generale tra le piante testate

La tecnologia ha come principale finalità il recupero dei terreni degradati

- premiscelazione dei suoli con componenti aggiuntive: rifiuti di diversa provenienza: fanghi biologici, sedimenti di dragaggio, fanghi di cartiera: se opportunamente dosate e sottoposte al trattamento, possono essere incorporate producendo i terreni ricostituiti
- sgretolamento e frammentazione degli aggregati, unitamente ad un'eventuale aggiunta di composti umici, e ad una ulteriore miscelazione
- disgregazione: opera mediante un sistema meccanico che realizza un'intensa scomposizione e destrutturazione unita alla sfibratura e dispersione delle componenti organiche all'interno dell'intera massa;
- ricostituzione: operata mediante pressioni meccaniche realizzate da un sistema rotante, provvede all'incorporazione e adesione della sostanza organica nella frazione minerale generando i neo aggregati del suolo ricostituito

Gli interventi di miglioramento agronomico dei suoli mediante la tecnologia della ricostituzione agiscono, sulle seguenti proprietà pedologiche

Incremento dello spessore del suolo – profondità utile delle radici (*da scarsa ad elevata*)

Riduzione dello scheletro e della pietrosità superficiale (*da frequente a scarso/a*)

Miglioramento della struttura degli aggregati – incremento della porosità

Aumento della ritenzione idrica

Diminuzione della reazione (*da 8,3 a 7,9 pH*)

Riduzione del Calcare attivo e del Calcare totale

Incremento della sostanza organica e del rapporto C/N

Aumento della frazione umica

Incremento della disponibilità del Fosforo P Olsen

Analisi acqua del suolo

- pH
- EC
- Fe, Mn
- Cationi
- Anioni

Hydra Probe dati

- temperatura
- EC
- umidità

Analisi lisciviato

- pH
- EC
- N tot
- Nitrati
- As, Cd, Cr, Hg, Ni, Pb, Cu, Zn

Considerazioni finali

Tutti e 4 i progetti Life CLEANSED, HORTISED, SUBSED e AGRISED implementano il concetto di economia circolare attraverso azioni che garantiscono il riciclo di sedimenti di dragaggio in settori produttivi ambientali e agricoli, contribuendo in modo rilevante alla gestione sostenibile dei rifiuti

-In particolare, il progetto **CLEANSED** ha dimostrato, per la prima volta, la possibilità di riciclare i sedimenti di dragaggio, opportunamente trattati (fitorimediazione e landfarming), in vivaistica in alternativa ai substrati di crescita tradizionali e anche nella costruzione di strade

-Il progetto **HORTISED** ha dimostrato, per la prima volta, la possibilità di riciclare i sedimenti di dragaggio, opportunamente trattati, in orticoltura, in alternativa alla torba

-Con il progetto SUBSED vogliamo confermare i risultati ottenuti sia in vivaistica (**CLEANSED**) che in orticoltura (**HORTISED**); i risultati preliminari sono promettenti

-Nel progetto **AGRISED** al momento è stata dimostrata la possibilità di co-compostare i sedimenti con scarti verdi per la produzione di un substrato di crescita per la vivaistica e per la ricostituzione di suoli. Le prove sperimentali sono attualmente in corso e confermeranno l'idoneità del substrato in questi 2 settori ambientali

Tutti i progetti potrebbero dare un rilevante contributo alla
[gestione sostenibile dei rifiuti](#)

Articoli scientifici sul riutilizzo dei sedimenti decontaminati

1. Macci C, Peruzzi E, Doni S, Vannucchi F, Masciandaro G (2021). Landfarming as a sustainable management strategy for fresh and phytoremediated sediment. *Environmental Science and Pollution Research* doi: 10.1007/s11356-021-13134-y
2. Tozzi F, Del Bubba M, Petrucci WA, Pecchioli S, Macci C, Hernandez Garcia F, Martinez-Nicolas JJ, Giordani E (2020) Use of a remediated dredged marine sediment as a substrate for food crop cultivation: sediment characterization and assessment of fruit safety and quality using strawberry (*Fragaria x ananassa* Duch.) as model species of contamination transfer. *Chemosphere* 238 124651 <https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2019.124651>
3. Peruzzi, E., Macci, C., Doni, S., Zelari, L., 2019 Masciandaro, G Co-composting as a Management Strategy for *Posidonia oceanica* Residues and Dredged Sediments. *Waste and Biomass Valorization* doi/10.1007/s12649-019-00822-7.
4. Tozzi F, Pecchioli S, Renella G, Melgarejo P, Leguac P, Macci C, Doni S, Masciandaro G, Giordani E, Lenzi A (2019) Remediated marine sediment as growing medium for lettuce production: assessment of agronomic performance and food safety in a pilot experiment Running title: reusing dredged sediments as growing media. *J Sci Food Agric.* 5624–5630 <https://doi.org/10.1002/jsfa.9815>.
5. Mattei P, Gnesini A, Gonnelli C, Marraccini C, Masciandaro G, Macci C, Doni S, Iannelli R, Lucchetti S, Nicese FP, Renella G (2018) Phytoremediated marine sediments as suitable peat-free growing media for production of red robin photinia (*Photinia x fraseri*) *Chemosphere* 201, 595-602. DOI: 10.1016/j.chemosphere.2018.02.172
6. Ugolini F, Mariotti B, Maltoni A, Tani A, Salbitano F, Izquierdo CG, Macci C, Masciandaro G, Tognetti R (2018). A tree from waste: Decontaminated dredged sediments for growing forest tree seedlings. *Journal of environmental management*, 211, 269-277. 10.1016/j.jenvman.2018.01.059.
7. Ugolini F, Calzolari C, Lanini GM, Massetti L, Pollaki S, Raschi A, Sabatini F, Tagliaferri G, Ungaro F, Massa D, Antonetti M, Garcia Izquierdo C, Macci C, Masciandaro G (2017) Testing decontaminated sediments as a substrate for ornamentals in field nursery plantations *Journal of Environmental Management* 197, 681-693. DOI 10.1016/j.jenvman.2017.03.064. ISSN: 0301-4797.
8. Mattei P, D'Acqui LP, Nicese FP, Lazzerini G, Masciandaro G, Macci C, Doni, S, Sarteschi F, Giagnoni L, Renella G (2017) Use of phytoremediated sediments dredged in maritime port as plant nursery growing media. *Journal of Environmental Management* 186, 225-232.
9. Ugolini, F., Calzolari, C., Lanini, G.M., Massetti, L., Sabatini, F., Ungaro, F., Damiano, S., Izquierdo, C.G., Macci, C., Masciandaro, G. (2017). Physiological performance and growth of *Viburnum tinus* L. on phytoremediated sediments for plant nursing purpose. *IForest* 10, 55-63. DOI 10.3832/ifor1840-009.